

Het $3n + 1$ -vermoeden

Benne de Weger

b.m.m.d.weger@tue.nl

Vakantiecursus 2013



TU/e Technische Universiteit
Eindhoven
University of Technology

Where innovation starts

Het $3n + 1$ -proces

1/35

Neem een natuurlijk getal.

- ▶ Is het even, dan deel je het door 2.
- ▶ Is het oneven, dan vermenigvuldig je het met 3 en tel je er 1 bij op.

Met de uitkomst doe je hetzelfde, net zo lang tot je het zat bent.

$1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow \dots$ (ik ben het al zat)

$2 \rightarrow 1 \rightarrow \dots$ (al gezien)

$3 \rightarrow 10 \rightarrow 5 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow \dots$ (al gezien)

$4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow \dots$ (al gezien)

$5 \rightarrow 16 \rightarrow \dots$ (al gezien) $\dots \rightarrow 1 \rightarrow \dots$

$6 \rightarrow 3 \rightarrow 10 \rightarrow \dots$ (al gezien) $\dots \rightarrow 1 \rightarrow \dots$

$7 \rightarrow 22 \rightarrow 11 \rightarrow 34 \rightarrow 17 \rightarrow 52 \rightarrow 26 \rightarrow 13 \rightarrow 40 \rightarrow 20 \rightarrow 10 \rightarrow 5 \rightarrow \dots$ (al gezien) $\dots \rightarrow 1 \rightarrow \dots$

Na een oneven getal komt *altijd* een even getal en dus *altijd* een deel-door-2-stap. Die twee stappen zien we voortaan als één stap.

De $3n + 1$ -functie $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ is gedefinieerd door

$$T(n) = \begin{cases} n/2 & \text{als } n \text{ even is,} \\ (3n + 1)/2 & \text{als } n \text{ oneven is.} \end{cases}$$

Het $3n + 1$ -proces is nu *iteratie* van T :

$$n \rightarrow T(n) \rightarrow T(T(n)) \rightarrow T(T(T(n))) \rightarrow \dots \rightarrow T(\dots T(n) \dots) \rightarrow \dots$$

Dat kunnen we handiger noteren:

$$n \rightarrow T(n) \rightarrow T^2(n) \rightarrow T^3(n) \rightarrow \dots \rightarrow T^k(n) \rightarrow \dots$$

Voorbeeld:

$$7 \rightarrow 11 \rightarrow 17 \rightarrow 26 \rightarrow 13 \rightarrow 20 \rightarrow 10 \rightarrow 5 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightleftharpoons 1$$

Het $3n + 1$ -vermoeden

Het $3n + 1$ -vermoeden is nu:

Met ieder positief geheel getal n als startwaarde komt het $3n + 1$ -proces op den duur uit bij 1, en ‘eindigt’ dus in $\dots \rightarrow 2 \rightleftharpoons 1$:

$$n \rightarrow T(n) \rightarrow T^2(n) \rightarrow \dots \rightarrow 2 \rightleftharpoons 1.$$

Wat formeler:

Voor iedere $n \in \mathbb{N}$ is er een $k \in \mathbb{N}$ zodat $T^k(n) = 1$.

Deze cykel $1 \rightleftharpoons 2$ noemen we de *triviale cykel*.

Voor $n \in \mathbb{N}$ noemen we de rij $n \rightarrow T(n) \rightarrow T^2(n) \rightarrow \dots$ de *baan* van n .

Als voor zekere $k, n \in \mathbb{N}$ geldt dat $T^k(n) = n$
dan noemen we $(n, T(n), T^2(n), \dots, T^{k-1}(n))$ een *cykel*.

Voorbeeld: de triviale cykel noteren we dus als $(1, 2)$ (of $(2, 1)$).

Als een baan een cykel bevat (en daar dus in eindigt), dan noemen we de baan *convergent*. Een niet-convergente baan heet *divergent*.

Een divergente baan is onbegrensd.

Banen kunnen lang divergent lijken:

27 → 41 → 62 → 31 → 47 → 71 → 107 → 161 → 242 → 121 → 182 → 91 → 137 →
206 → 103 → 155 → 233 → 350 → 175 → 263 → 395 → 593 → 890 → 445 → 668 →
334 → 167 → 251 → 377 → 566 → 283 → 425 → 638 → 319 → 479 → 719 → 1079 →
1619 → 2429 → 3644 → 1822 → 911 → 1367 → 2051 → 3077 → 4616 → 2308 →
1154 → 577 → 866 → 433 → 650 → 325 → 488 → 244 → 122 → 61 → 92 → 46 → 23 →
35 → 53 → 80 → 40 → 20 → 10 → 5 → 8 → 4 → 2 ⇐ 1

maar toch convergent blijken.

Geschiedenis

Lothar Collatz heeft het (naar eigen zeggen) rond 1930 bedacht.

In 1950 praatte hij er met verschillende mensen over op het ICM in Cambridge (Mass.) en raakte het bekend.

In de jaren 60 verschijnen de eerste artikelen over varianten van het probleem (o.a. een variant beschreven door Raymond Queneau gerelateerd aan rijmschema's in 12e-eeuwse poezie).

In 1971 verschijnt het echte $3n + 1$ -probleem voor het eerst in druk. Martin Gardner schrijft erover in 1972, en dan wordt het beroemd.

Het staat nu ook bekend als o.a. het Syracuse-probleem, het probleem van Hasse, van Kakutani, van Coxeter, van Ulam, hagesteen-getallen, enzovoorts.

Jaren 60: 8 artikelen, jaren 70: 34 artikelen, jaren 80: 52 artikelen, jaren 90: 103 artikelen, jaren 00: 134 artikelen.

- ▶ Jeffrey C. Lagarias (ed.): *The Ultimate Challenge: The $3x + 1$ Problem*, Am. Math. Soc., 2010
dit boek is een bundeling van de belangrijkste artikelen
- ▶ Jeffrey C. Lagarias, “The $3x + 1$ problem and its generalizations”, Am. Math. Monthly 92 [1985], 3–23
gedetailleerde geschiedenis tot 1985
- ▶ Jeffrey C. Lagarias, “The $3x + 1$ problem: an annotated bibliography (1963–1999)”, arxiv.org.
korte samenvattingen van alle verschenen artikelen voor 2000
- ▶ Jeffrey C. Lagarias, “The $3x + 1$ problem: an annotated bibliography II (2000–2009)”, arxiv.org.
korte samenvattingen van alle verschenen artikelen in 2000–2009


Waarom zou het $3n + 1$ -vermoeden waar zijn?

Argumenten:

- ▶ Experimenteel
- ▶ Probabilistisch
- ▶ Logisch / Complexiteitstheoretisch
- ▶ Diophantisch
- ▶ Dynamische systemen / ergodisch (zeg ik niets over)

Herformuleringen:

- ▶ Grafen
- ▶ Modulaire en De Bruijn-grafen
- ▶ Oneindige matrices
- ▶ Eigenruimtes
- ▶ Functionaalvergelijkingen



Verwante problemen: $3n - 1$

De $3n - 1$ -functie:


$$T_{3,-1}(n) = \begin{cases} n/2 & \text{als } n \text{ even is,} \\ (3n - 1)/2 & \text{als } n \text{ oneven is.} \end{cases}$$

Equivalent met $3n + 1$ op de negatieve getallen:

$$T_{3,-1}(n) = -T(-n)$$

Er zijn (vermoedelijk) 3 cyclen, en (vermoedelijk) geen divergente banen


Deze graaf is niet samenhangend, er zijn tenminste 3 componenten.



De $5n + 1$ -functie:

$$T_{5,1}(n) = \begin{cases} n/2 & \text{als } n \text{ even is,} \\ (5n + 1)/2 & \text{als } n \text{ oneven is.} \end{cases}$$


Er zijn (vermoedelijk) 3 cyclen, en (vermoedelijk) oneindig veel divergente banen




De $3n + 3$ -functie:

$$T_{3,3}(n) = \begin{cases} n/2 & \text{als } n \text{ even is,} \\ (3n + 3)/2 & \text{als } n \text{ oneven is.} \end{cases}$$

De deelgraaf van alle drievouden is isomorf met de $3n + 1$ -graaf





(even noemer is niet interessant: de teller is dan altijd oneven en dan is iteratie flauw)

Dit is in feite de $3n + q$ -graaf voor alle oneven q tegelijk

Iedere $\frac{a}{b}$ met oneven b heeft nu twee voorgangers: $\frac{2a}{b}$ en $\frac{2a-b}{3b}$

Vermoedelijk zijn er geen divergente banen

Er zijn oneindig veel convergente banen, en die zijn goed te beschrijven

Alle cyclen in de rationale $3n + 1$ -graaf

Iedere convergente baan eindigt in een cykel, en iedere cykel heeft een even-oneven - structuur:

lengte 1: 2 mogelijkheden: e, o

lengte 2: 1 mogelijkheid: eo

lengte 3: 2 mogelijkheden: eeo, eoo

lengte 4: 3 mogelijkheden: $eeeo, eeoo, eooo$

lengte 5: 6 mog.: $eeeeo, eeeoo, eeoeo, eeooo, eoeeo, eoooo$
enzovoorts, de zogeheten Lyndon-woorden.

Bij ieder Lyndon-woord is voor de cykel een vergelijking op te stellen die maar één oplossing heeft:

bv. bij eo hoort $x \xrightarrow{e} \frac{1}{2}x \xrightarrow{o} \frac{3}{4}x + \frac{1}{2} \xrightarrow{o} \frac{9}{8}x + \frac{5}{4} = x$ dus $x = -10$, dit geeft de bekende cykel $-10 \rightarrow -5 \rightarrow -7 \rightarrow -10$

Uit een gegeven cykel is de hele component achterwaarts te berekenen: op iedere node een complete binaire boom. Heel veel structuur!

$$U(n) = \begin{cases} (3n)/2 & \text{als } n \text{ even is,} \\ (3n + 1)/4 & \text{als } n \equiv 1 \pmod{4}, \\ (3n - 1)/4 & \text{als } n \equiv -1 \pmod{4} \end{cases}$$


Is eigenlijk ouder dan de $3n + 1$ -functie T zelf (aldus Collatz). Deze functie is een permutatie op \mathbb{N} . Dus U^{-1} bestaat:

$$U^{-1}(n) = \begin{cases} (2n)/3 & \text{als } n \equiv 0 \pmod{3}, \\ (4n - 1)/3 & \text{als } n \equiv 1 \pmod{3}, \\ (4n + 1)/3 & \text{als } n \equiv -1 \pmod{3} \end{cases}$$

John Conway noemt het de *amusicale permutatie*.

In de graaf heeft ieder getal dus precies één voorganger, en er zijn geen 'inkomende zijtakken'.

De 'amusicale permutatie'



Vermoedelijk zijn er geen andere cykels.

Vermoedelijk zijn er oneindig veel divergente banen..

Tomás Oliveira e Silva:

Het $3n + 1$ -vermoeden is waar voor alle $n < 5.764 \times 10^{18}$

Dit is een indrukwekkende prestatie!

Bruut rekenwerk, met een beetje boerenslimheid:

- ▶ je kunt stoppen met de baan van n als-ie onder de n is uitgekomen
- ▶ veel congruentieklassen modulo machten van 2 hoef je niet te doen, bv. $T^7(128m + 15) = 81m + 10 < 128m + 15$

Toch is hiermee slechts 0% van het totale zoekgebied afgezocht...
... en met dit soort technieken kom je nooit verder dan 0%.

Veel experimentele gegevens gevonden door Eric Roosendaal, zie
<http://www.ericr.nl/wondrous/>

Probabilistisch

De T -functie geeft bij random even/oneven verdeelde invoer n ook random even/oneven verdeelde uitvoer $T(n)$.

Dan is $T(n) \approx \frac{3}{2}n$ met kans $1/2$, en $T(n) = \frac{1}{2}n$ met kans $1/2$, dus

$$T^k(n) \approx \left(\frac{3}{2}\right)^{k/2} \left(\frac{1}{2}\right)^{k/2} n = \left(\frac{1}{2}\sqrt{3}\right)^k n.$$


Merk op dat $\frac{1}{2}\sqrt{3} \approx 0.866$. Na $k \approx 6.95 \log n$ stappen verwacht je bij 1 te zijn. Dit blijkt experimenteel heel aardig te kloppen.

Net zo voor $3n + q$ voor willekeurige q , en (dus) voor rationale $3n + 1$.


Diepergaande stochastische modellen voorspellen dingen als:

- ▶ extreem hoge banen bereiken hoogste punt $\approx n^{2+o(1)}$ na $7.645 \log n$ stappen, dan nog $13.9 \log n$ stappen om bij 1 te komen
- ▶ extreem lange banen zullen niet langer worden dan $41.7 \log n$.


Dit soort modellen is allemaal experimenteel bevestigd.



Argument werkt ook voor $5n + 1$: factor is nu $\frac{1}{2}\sqrt{5} \approx 1.12$,
dus nu is divergentie zeer waarschijnlijk.



Voor de amusicale permutatie is de factor $\frac{3}{4}\sqrt{2} \approx 1.061$ voorwaarts, en $\frac{2}{3}\sqrt[3]{4} \approx 1.058$ achterwaarts, dus nu is divergentie zowel voorwaarts als achterwaarts zeer waarschijnlijk.



Logisch en Complexiteitstheoretisch

Conway: er is een generalisatie van de $3n + 1$ -functie deswelks iteratie een universele computer (Turingmachine) simuleert.

Voor deze functie is het beslisprobleem "bereikt een baan een willekeurige macht van 2" computationeel onbeslisbaar.

In zijn artikel "In un settleable arithmetical problems" (Am. Math. Monthly 120 [maart 2013], 192–198) zegt John Conway:

"It is likely that some simple Collatzian problems (possibly even the $3n + 1$ problem itself) will remain forever un settleable."

Maar laat dit u de moed niet ontnemen...

Een m -cykel is een cykel voor de $3n + 1$ -functie met m maxima en m minima.

De triviale cykel is een 1-cykel. N.B.: m is niet de lengte van de cykel.

Ray Steiner bewees in 1977 dat de triviale cykel de enige 1-cykel is. Het argument is grofweg dit:

Als je vanuit n eerst k stappen omhoog gaat en dan ℓ stappen omlaag, dan is $n = T^{k+\ell}(n) \approx \left(\frac{3}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^\ell n$ dus is $3^k \approx 2^{k+\ell}$.

Transcendentietheorie (Alan Baker (1966)) zegt (op een kwantitatieve manier) dat machten van gehele getallen niet dicht bij elkaar kunnen liggen.

Diophantisch (vervolg)

Dit argument van Steiner is algemener te maken.

John Simons (Groningen) bewees in 2004 met soortgelijke argumenten als Steiner dat er geen 2-cykels bestaan.

Simons & dW bewezen daarop in 2005-2010, gebaseerd op de ondergrens van Oliveira e Silva:

Er bestaan geen niet-triviale m -cyclen met $m \leq 75$.

Uit getaltheoretische eigenschappen van het getal $\frac{\log 3}{\log 2}$ en Oliveira e Silva's grens 5.764×10^{18} volgt ook

Een eventuele niet-triviale cykel heeft lengte $> 1.43 \times 10^9$.


Het $3n + 1$ -vermoeden is equivalent met:

De $3n + 1$ -graaf is samenhangend.

Dit is een herformulering die natuurlijk niet zo veel zegt.

Modulaire $3n + 1$ - en De Bruijn-grafen

De modulaire $3n + 1$ -graaf met modulus m bevat alle mogelijke pijlen van $n \pmod{m}$ naar $T(n) \pmod{m}$. Dit soort grafen blijkt weinig structuur te hebben, behalve als $m = 2^k$. Dan zijn het De Bruijn-grafen, die ontstaan uit de shiftafbeelding $a_1 a_2 \cdots a_n \rightarrow a_2 \cdots a_n *$, met $*$ $\in \{0, 1\}$. (Laarhoven-dW 2013).



Voor iedere $pn + q$ -functie is de modulaire graaf met modulus 2^k dezelfde k -e orde De Bruijn-graaf. Alleen is de labeling van de punten in de graaf telkens anders (deze labeling is de conjugatie-afbeelding Φ_k).

$\Phi_k : n \rightarrow a_1 a_2 \dots a_k$ met a_1 de pariteit van n , a_2 de pariteit van $T(n)$, \dots , a_k de pariteit van $T^k(n)$.


De $pn + q$ -graaf modulo 2^k hangt qua structuur dus niet van p, q af, maar de conjugatie-afbeelding die de modulaire $pn + q$ -graaf afbeeldt op de De Bruijn-graaf, hangt sterk van p, q af.

De oneindige De Bruijn-graaf

Voor $k \rightarrow \infty$ krijg je de oneindige De Bruijn-graaf $B(\mathbb{Z}_2)$, gebaseerd op de shiftafbeelding op oneindige rijtjes: $a_1 a_2 a_3 \dots \rightarrow a_2 a_3 \dots$.

Deze graaf heeft alle mogelijke cykels (uit Lyndon-woorden) opgetuigd met binaire bomen, en overaftelbaar veel componenten zonder cykel, elk een naar twee kanten oneindige volledige binaire boom.

Een monsterachtig ding, maar met heel veel structuur. Hierin verstopt zitten alle interessante $pn + q$ -graften.



Bij een graaf hoort een vierkante *verbindingsmatrix* $A = (a_{i,j})$ met $a_{i,j} = 1$ als er een pijl van i naar j loopt, en anders $a_{i,j} = 0$. Het spectrum van zo'n matrix zegt iets over de graaf.

De $3n + 1$ -graaf is oneindig, er hoort dus een oneindige matrix $A = (a_{i,j})$ bij met $a_{n,T(n)} = 1$ voor alle $n \in \mathbb{N}$, en anders $a_{i,j} = 0$. Deze graaf ziet er heel gestructureerd uit:

$$A = \begin{pmatrix} \cdot 1 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \\ 1 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \\ \cdot \cdot \cdot 1 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \\ \cdot 1 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \\ \cdot \cdot 1 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \\ \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 1 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \\ \cdot \cdot \cdot 1 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \\ \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 1 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \\ \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 1 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \\ \cdot 1 \cdot \cdot \cdot \\ \cdot 1 \cdot \cdot \cdot \\ \vdots \\ \vdots \end{pmatrix}$$

Machten van matrices

De k -e macht van A beschrijft paden van lengte k . Als we k laten groeien lijkt A^k op den duur alleen in de eerste twee kolommen iets over te houden:

$$A^{2k} = \begin{pmatrix} 1 \cdot \cdot \cdot \\ \cdot 1 \cdot \cdot \\ \cdot 1 \cdot \cdot \\ 1 \cdot \cdot \cdot \\ 1 \cdot \cdot \cdot \\ 1 \cdot \cdot \cdot \\ \cdot 1 \cdot \cdot \\ \cdot 1 \cdot \cdot \\ \cdot 1 \cdot \cdot \\ \cdot 1 \cdot \cdot \\ \cdot 1 \cdot \cdot \\ 1 \cdot \cdot \cdot \\ \cdot 1 \cdot \cdot \end{pmatrix}, A^{2k+1} = \begin{pmatrix} \cdot 1 \cdot \cdot \\ 1 \cdot \cdot \cdot \\ 1 \cdot \cdot \cdot \\ \cdot 1 \cdot \cdot \\ \cdot 1 \cdot \cdot \\ \cdot 1 \cdot \cdot \\ 1 \cdot \cdot \cdot \\ 1 \cdot \cdot \cdot \\ 1 \cdot \cdot \cdot \\ 1 \cdot \cdot \cdot \\ 1 \cdot \cdot \cdot \\ \cdot 1 \cdot \cdot \\ 1 \cdot \cdot \cdot \end{pmatrix}$$

Het $3n + 1$ -vermoeden is equivalent met de bewering dat voor $k \rightarrow \infty$ de matrices A^{2k} en A^{2k+1} convergeren naar resp. $(a_0, a_1, 0, 0, \dots)$ en $(a_1, a_0, 0, 0, \dots)$, waarbij $a_0 + a_1 = (1, 1, 1, \dots)$.

(Engl, 1982) De dimensie van de eigenruimte van A bij de eigenwaarde 1 is gelijk aan het aantal samenhangscomponenten in de graaf. Het $3n + 1$ -vermoeden is dus equivalent met de bewering dat de eigenruimte bij de eigenwaarde 1 van de matrix A ééndimensionaal is.

Het complete spectrum van A en A^T is inmiddels in kaart gebracht (Laarhoven & dW, artikel in voorbereiding).

Functionaalvergelijkingen

Berg en Meinardus (1994) gaan nog een andere interessante kant op. We bekijken de machtreeks

$$f(z) = e_0 + e_1 z + e_2 z^2 + \dots + e_n z^n + \dots,$$

waarbij we voorschrijven dat $e_n = e_{T(n)}$ voor alle n . Wat zou dit betekenen voor f ? Dat f voldoet aan de functionaalvergelijking

$$3z (f(z^3) - f(z^6)) = f(z^2) + \omega f(\omega z^2) + \bar{\omega} f(\bar{\omega} z^2)$$

met $\omega = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\sqrt{3}$. Een afleiding staat in het cursusboekje.

Deze functionaalvergelijking is lineair. Twee oplossingen zijn $f(z) = 1$ en $f(z) = \frac{z}{1-z} = z + z^2 + z^3 + \dots$


Ook hier geldt weer dat er een directe relatie is met samenhangscomponenten in de $3n + 1$ -graaf.

Het $3n + 1$ -vermoeden is equivalent met de bewering dat deze functionaalvergelijking een 2-dimensionale oplossingsruimte in machtreeksen heeft.

Als we $e_n = -e_{T(n)}$ nemen dan vinden we de functionaalvergelijking

$$3z(-f(z^3) - f(z^6)) = f(z^2) + \omega f(\omega z^2) + \bar{\omega} f(\bar{\omega} z^2)$$

met als oplossing $f(z) = z - z^2 - z^3 + z^4 + z^5 + z^6 - z^7 - \dots$, waar de ± 1 geeft aan of je met de $3n + 1$ -functie in een even of een oneven aantal stappen bij 1 uitkomt. Het zou interessant zijn voor deze functie een gesloten uitdrukking te vinden.



De amusicale functionaalvergelijking

Doen we hetzelfde voor Conway's amusicale permutatie, dan krijgen we

$$\begin{aligned} 2z(2f(z^4) - f(z^6) - f(-z^6)) &= \\ &= (z^2 + 1)(f(z^3) - f(-z^3)) - i(z^2 - 1)(f(iz^3) - f(-iz^3)) \end{aligned}$$

De vier cycli in de graaf zijn nu eindige componenten, dat betekent dat deze vergelijking polynomiale oplossingen heeft: $f(z) = z$, $f(z) = z^2 + z^3$, $f(z) = z^4 + z^5 + z^6 + z^7 + z^9$ en

$$f(z) = z^{44} + z^{59} + z^{62} + z^{66} + z^{70} + z^{74} + z^{79} + z^{83} + z^{93} + z^{99} + z^{105} + z^{111}.$$

Het vermoeden is dat er (naast ook $f(z) = 1$) niet meer onafhankelijke polynomiale oplossingen zijn. Wel zijn er (vermoedelijk oneindig veel onafhankelijke) machtreeks-oplossingen, zoals


$$f(z) = z^8 + z^{10} + z^{11} + z^{12} + z^{13} + z^{15} + z^{17} + z^{18} + z^{20} + \dots$$

Het $3n + 1$ -vermoeden is een “gênant probleem” (Ionica Smeets): makkelijk te formuleren maar heel moeilijk op te lossen.

Het heeft verbanden met uiteenlopende stukken wiskunde.

Dat geeft tot nu toe wat inzicht in hoe moeilijk het probleem is, en wellicht enige hoop dat op één van die deelgebieden iets echt interessants te vinden is.

<http://xkcd.com/710/>



Vragen?

THE COLLATZ CONJECTURE STATES THAT IF YOU PICK A NUMBER, AND IF IT'S EVEN DIVIDE IT BY TWO AND IF IT'S ODD MULTIPLY IT BY THREE AND ADD ONE, AND YOU REPEAT THIS PROCEDURE LONG ENOUGH, EVENTUALLY YOUR FRIENDS WILL STOP CALLING TO SEE IF YOU WANT TO HANG OUT.